Лекция 4

Почему и как идут химические реакции

План лекции

1. **Классификация** химических реакций.
2. **Стехиометрическое** описание химической реакции.
3. **Энергетическая кривая** элементарной химической реакции. Прямая и обратная реакции.
4. Термодинамическое описание химических реакций.
Второй закон в применении к химическим процессам.
5. Химическое **равновесие**. Константа равновесия.
Принцип Ле Шателье.
6. Характерные **времена** химических реакций.
Энергетический барьер химической реакции. Способы активации реагентов.
7. Понятие о **механизме** химической реакции.
Лимитирующая стадия.

Что такое химическая реакция

Это - превращение одних веществ (**реагентов**) в другие (**продукты**), происходящее за счет разрыва старых и/или образования новых химических связей.

Продукты отличаются от реагентов **составом** и/или **строением**.

При химических реакциях **ядра атомов не изменяются**, общее число атомов каждого вида остается неизменным.

Классификация химических реакций

По типу:

соединения	$A + B \rightarrow P$
разложения	$A \rightarrow P + Q$
обмена (замещения)	$A + BC \rightarrow AB + C$

По характеру переносимой частицы:

перенос протона	(кисл.-осн. реакции)
перенос электрона	(ок.-восст. реакции)

По тепловому эффекту:

ЭКЗО	термические (теплота выдел.)
ЭНДО	термические (теплота погл.)

По обратимости:

обратимые
необратимые

Стехиометрические соотношения

Уравнение
реакции

Стехиометри-
ческий расчет

$$\frac{n(A_i)}{\nu_i} = \frac{n(B_j)}{\nu_j}$$

Химическая
переменная

$$d\xi = -\frac{dn(A_i)}{\nu_i} = \frac{dn(B_j)}{\nu_j}$$

$$\begin{cases} n_i = n_{i,0} - \nu_i \xi & \text{(реагенты)} \\ n_j = n_{j,0} + \nu_j \xi & \text{(продукты)} \end{cases}$$

Энергетическая кривая

Сечение полной поверхности потенциальной энергии ядер вдоль пути наименьшей энергии

Физики, 1 курс. Весна 2017

Переходный (активированный) комплекс – конфигурация ядер, соответствующая переходу от реагентов к продуктам.

Прямая и обратная реакции

Теоретически все реакции обратимы, практически – нет

$$Q_{\text{обр}} = -Q_{\text{пр}}$$

$$E_{\text{обр}} = E_{\text{пр}} + Q_{\text{пр}}$$

Почему идут химические реакции

- **Общий принцип – термодинамический:**
самопроизвольные реакции увеличивают общую энтропию Вселенной
- **Необходимое условие – кинетическое:**
надо преодолеть энергетический барьер между реагентами и продуктами.
Способы:
 - а) нагревание;
 - б) действие света;
 - в) использование катализатора;
 - г) подбор растворителя.

Термодинамическое описание химической реакции

$$\Delta_r F = F(\text{прод.}) - F(\text{реакт.}) = \sum_j \nu_j F(B_j) - \sum_i \nu_i F(A_i)$$

$$F = H(\text{энтальпия}), S(\text{энтропия}), G(\text{энергия Гиббса})$$
$$G = H - TS$$

Для расчета $\Delta_r H$ и $\Delta_r G$ используют формулу:

$$\Delta_r F = \Delta_f F(\text{прод.}) - \Delta_f F(\text{реакт.}) = \sum_j \nu_j \Delta_f F(B_j) - \sum_i \nu_i \Delta_f F(A_i)$$

Термодинамическое описание химической реакции

$\Delta_r H = Q_p$ – **тепловой эффект** реакции при постоянном давлении

$\Delta_r H < 0$ – теплота выделяется

$\Delta_r H > 0$ – теплота поглощается

$$\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S$$

характеризует **ВОЗМОЖНОСТЬ** протекания реакции

Второй закон в химии

Самопроизвольно могут протекать ТОЛЬКО те химические реакции, которые приводят к увеличению **общей энтропии** Вселенной.

Химические системы – не изолированы, в них поглощается или выделяется теплота

$$\Delta S_{\text{Всел.}} = \Delta S_{\text{хим.р.}} + \Delta S_{\text{окр.ср.}} > 0$$

$$\Delta S_{\text{окр.ср.}} = - \frac{\Delta H_{\text{хим.р.}}}{T},$$

$$\Delta S_{\text{хим.р.}} - \frac{\Delta H_{\text{хим.р.}}}{T} > 0$$

$$\Delta H - T \Delta S < 0$$

Энтальпийный и энтропийный факторы

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$$

общий критерий самопроизвольности химических реакций
при $P, T = \text{const}$

Теплота	Энтропия	Реакция возможна при	Пример
Выделяется $\Delta H < 0$	Увеличивается $\Delta S > 0$	любых температурах	$2\text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
Выделяется $\Delta H < 0$	Уменьшается $\Delta S < 0$	низких температурах, когда $ \Delta H > T \Delta S $	$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3$
Поглощается $\Delta H > 0$	Увеличивается $\Delta S > 0$	высоких температурах, когда $T\Delta S > \Delta H$	$\text{CaCO}_3 = \text{CaO} + \text{CO}_2$

Справочные и расчетные данные

Индивидуальные вещества в стандартном состоянии:

C_p – изобарная теплоемкость

S° – абсолютная энтропия

$(G^\circ - H^\circ_{298}) / T$ – приведенный потенциал Гиббса

$H^\circ - H^\circ_{298}$ – энтальпия, отсчитанная от 298 К

$\Delta_f H^\circ_{298}$ – энтальпия образования

$\Delta_f G^\circ_{298}$ – энергия Гиббса образования

Химические реакции:

$\Delta_r C_p$ – изменение теплоемкости

$\Delta_r S^\circ$ – изменение энтропии (энтропия реакции)

$\Delta_r H^\circ$ – изменение энтальпии (энтальпия реакции)

$\Delta_r G^\circ$ – изменение энергии Гиббса

$\lg K$ – логарифм константы равновесия реакции

Химическое равновесие

Химическое равновесие – состояние системы, в которой протекают химические реакции, но:

- 1) количества веществ не зависят от времени,
- 2) отсутствуют потоки массы и энергии.

При химическом равновесии **скорости прямой и обратной реакций равны**

Термодинамическое условие химического равновесия:

$$\Delta_r G = 0$$

Химическое равновесие характеризуется **константой равновесия K**

$K \gg 1$ – реакция идет практически **до конца**

$K \ll 1$ – реакция практически **не идет**

$K \sim 1$ – в равновесной смеси присутствуют как продукты, так и реагенты

Зависимость энергии Гиббса от химической переменной, $G(\xi)$

НЕ ПУТАТЬ
с энергетич.
кривой !!!

Химическое равновесие
УСТОЙЧИВО

$A = -\Delta_r G$ – химическое сродство (движущая сила реакции)

Зависимость $G(\xi)$. Три случая

**НЕ ПУТАТЬ
с энергетич.
кривой !!!**

Константа равновесия

$$\sum_i \nu_i A_i = \sum_j \nu_j B_j$$

$$K_a = \left(\frac{\prod_{j(\text{прод.})} a_j^{\nu_j}}{\prod_{i(\text{реак.})} a_i^{\nu_i}} \right)_{\text{eq}}$$

a_i – активность i -го вещества

$$a_i = \begin{cases} p_i / p^\circ & \text{– идеальный газ} \\ c_i / 1 \text{ моль/л} & \text{– раствор} \\ 1 & \text{– чистое ж. или тв. вещество} \end{cases}$$

$$K_a = \exp\left(-\frac{\Delta_r G_T^\circ}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{\Delta_r H_T^\circ}{RT}\right) \exp\left(\frac{\Delta_r S_T^\circ}{R}\right)$$

Примеры констант равновесия

$$K_a = K_p = \frac{p_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}}}{p_{\text{C}_2\text{H}_4} p_{\text{H}_2\text{O}}} \quad (p^\circ = 1)$$

$$K_a = K_p = \frac{p_{\text{SO}_3}^2}{p_{\text{SO}_2}^2 p_{\text{O}_2}}$$

$$K_a = \frac{p_{\text{NH}_3} p_{\text{HCl}}}{a_{\text{NH}_4\text{Cl}}} = p_{\text{NH}_3} p_{\text{HCl}}$$

$$K_a = \frac{a_{\text{MbO}_2}}{a_{\text{Mb}} p_{\text{O}_2}} \approx \frac{[\text{MbO}_2]}{[\text{Mb}] p_{\text{O}_2}}$$

Пример расчета равновесия

$$\begin{aligned}\Delta_r G_{298}^\circ &= \Delta_f G_{298}^\circ(\text{CaO}) + \Delta_f G_{298}^\circ(\text{CO}_2) - \Delta_f G_{298}^\circ(\text{CaCO}_3) = \\ &= -604 + (-394) - (-1129) = 131 \text{ кДж/моль}\end{aligned}$$

$$p_{\text{CO}_2} = K_p = \exp\left(-\frac{131000}{8.314 \cdot 298}\right) = 1.1 \cdot 10^{-23} \text{ бар} \sim 250 \frac{\text{молекул}}{\text{м}^3}$$

$$p_{\text{CO}_2} = 1 \text{ бар} \Rightarrow K_p = 1 \Rightarrow \Delta_r G_T^\circ = 0$$

$$T = \frac{\Delta_r H_T^\circ}{\Delta_r S_T^\circ} \sim 1100 \text{ К}$$

Еще один расчет

$$A = 2B$$

Пример:

$$K_p = \frac{p_B^2}{p_A} = \frac{\left(\frac{2x}{1+x}p\right)^2}{\frac{1-x}{1+x}p} = \frac{4x^2}{1-x^2}p$$
$$x = \sqrt{\frac{K_p}{K_p + 4p}}$$

При увеличении давления константа газового равновесия не изменяется, но выход продуктов уменьшается, то есть равновесие смещается влево – в сторону уменьшения объема

Принцип Ле Шателье

При внешнем воздействии на систему, находящуюся в состоянии химического равновесия, последнее смещается так, чтобы ослабить это воздействие.

«Смещение равновесия» **вправо** означает, что образуется **больше продуктов** (увеличивается выход прямой реакции), **влево** – больше реагентов (выход уменьшается).

Принцип Ле Шателье следует из **устойчивости химического равновесия**.

(Устойчивость любого термодинамического равновесия следует из постулатов термодинамики)

Некоторые качественные принципы

- Узнать, пойдет реакция или нет, можно **ТОЛЬКО экспериментально**.
- Как правило, хорошо реагируют друг с другом **вещества разной природы**:
 - металл + неметалл
 - кислота + основание
 - окислитель + восстановитель
- Во многих необратимых реакциях **продукты уходят** из сферы реакции:
 - а) выделяются в виде газа
 - б) выпадают из раствора в виде осадка
 - в) ионы связываются в молекулы слабого электролита

Химическая кинетика. Время в химии

Характерные времена химических реакций:

- 10^{-14} – 10^{-11} с – **элементарные реакции** образования и разрыва химических связей
- 10^{-6} с – **взрывные реакции** и реакции ионного обмена в растворе
- 10^0 – 10^4 с – **органические** реакции
- $> 10^{12}$ с – образование и разрушение горных пород

Время в химии изучает **химическая кинетика** – наука о **скоростях** и **механизмах** химических реакций

Механизм реакции

Механизм химической реакции - совокупность элементарных реакций, которые протекают в реакционной системе и реализуют превращение исходных веществ в продукты

Элементарная реакция – одна стадия (один максимум на энергетической кривой)

Двухстадийная реакция

Скорость реакции

Скорость реакции по веществу, r_i – изменение количества частиц i -го вещества в единицу времени в единице объема

$$r_i = \frac{1}{V} \frac{dN_i}{dt} \stackrel{V=\text{const}}{=} \frac{dc_i}{dt}$$

От чего зависит скорость реакции?

- От **концентрации** (**поверхности**) – закон действующих масс
- От **времени**: уменьшается в ходе реакции
- От **температуры**: увеличивается при нагр.
- От **катализатора**: увеличивается

Способы активации реагентов:

1. Нагревание
2. Измельчение (для тв.) или увеличение конц-ии
3. Использование катализатора
4. Освещение
5. Подбор растворителя

Кинетический закон действующих масс

Скорость **элементарной** реакции пропорциональна произведению концентраций каждого из реагентов в степенях, равных **молекулярности** по данному веществу $aA + bB \rightarrow zZ$

$$r = k c_A^a c_B^b$$

Кинетическое уравнение

Константа скорости, $k(T)$

Скорость **сложной** реакции пропорциональна произведению концентраций реагентов в некоторых степенях

$$r = k_{\text{эксп}} c_A^{n_A} c_B^{n_B}$$

Порядки реакции по веществам – n_A , n_B (могут быть положительными, отрицательными, нулевыми, дробными)

Общий порядок реакции: $n_A + n_B$

Принцип лимитирующей стадии

В **последовательных** реакциях общая скорость процесса определяется скоростью самой **медленной** стадии, а в **параллельных** – скоростью самой **быстрой** стадии

Примеры вопросов для экзамена

1. Укажите, какой фактор – энтропийный, энтальпийный или оба – определяет направление следующих реакций в газовой фазе:

2. Напишите выражение для константы равновесия реакции:

3. Как можно сместить вправо равновесие в реакциях:

4. Запишите выражение для зависимости скорости элементарных реакций от концентрации:

Важнейшие формулы

Расчет по уравнению реакции

$$\sum_i \nu_i A_i = \sum_j \nu_j B_j \quad \frac{n(A_i)}{\nu_i} = \frac{n(B_j)}{\nu_j}$$

Изменение термодинамических функций в реакции

$$\Delta_r F = F(\text{прод.}) - F(\text{реак.}) = \sum_j \nu_j F(B_j) - \sum_i \nu_i F(A_i)$$

Критерий самопроизвольности химической реакции

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S < 0$$

Связь константы равновесия со станд. энергией Гиббса реакции

$$K_a = \exp\left(-\frac{\Delta_r G_T^\circ}{RT}\right)$$

Скорость реакции

$$r_i = \frac{1}{V} \frac{dN_i}{dt} \stackrel{V=\text{const}}{=} \frac{dc_i}{dt}$$

Коротко о главном

- 1. Химическая реакция** – превращение реагентов в продукты. При химических реакциях ядра атомов не изменяются.
- Между реагентами и продуктами всегда есть **энергетический барьер** (**переходное состояние**). Для его преодоления используют активацию реагентов или катализатор.
- Химические реакции подчиняются **Второму Закону**. Самопроизвольные химические реакции **увеличивают энтропию Вселенной**. В самопроизвольных реакциях **энергия Гиббса уменьшается**.
- Состояние химического равновесия между реагентами и продуктами характеризуется **константой равновесия**. Чем больше константа равновесия, тем дальше прошла реакция.
- Многие термодинамически возможные реакции не идут. Возможность практического осуществления реакции зависит от ее **скорости**. Скорость определяется высотой энергетического барьера и состоянием реагентов (температура, концентрация, площадь поверхности)

Основные понятия

- Химическая реакция. Уравнение реакции
- Химическая переменная
- Энергетическая кривая химической реакции
- Энергия активации
- $\Delta_r H$, $\Delta_r S$, $\Delta_r G$
- Энтальпийный и энтропийный факторы
- Константа равновесия
- Принцип Ле Шателье
- Элементарная стадия. Механизм реакции
- Скорость элементарной реакции
- Закон действующих масс (кинетический)
- Лимитирующая стадия

Литература

1. Еремин, Борщевский. Общая и физическая химия. – Гл. 1, 28.
2. Еремин. Теоретическая и математическая химия. – Глава 3. §§ 1, 2, 4. Глава 4, §§ 1-3.
3. Ахметов. Неорганическая химия. – Раздел 5, гл. 1-4.
4. Глинка. Общая химия. – Глава 6.