Строение неорганических молекул

Подходы

Теория Гиллеспи

Конформации

*«Неорганическая химия» (под. ред. акад. Ю.Д.Третьякова), т.1
Ю.Д.Третьяков, А.В.Шевельков – материалы лекций*

Молекулы - сложные

Последний кадр из лекции профессора Ады Йонат «View into the ribosomal exit tunnel», Нобелевская премия по химии в 2009 г. (*VIII биофизический конгресс, Будапешт, автор фото – А.А.Семенова*)

«Рибосома — важнейший немембранный органоид живой клетки сферической или слегка эллипсоидной формы, диаметром 100—200 ангстрем, состоящий из большой и малой субъединиц. Рибосомы служат для биосинтеза белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, предоставляемой матричной РНК, или мРНК.» (Википедия)

Исследование структуры, конформации — важнейшая задача химии

Химические взаимодействия зависят от природы атомов, в том числе от их радиуса и электронного строения.

Тип и особенности химических связей в существенной степени определяют строение и комплекс химических, физико – химических и физических свойств вещества, в частности, для молекул с ковалентными (направленными) связями важнейшим параметром является **конформация** – пространственное расположение атомов, для твердых (кристаллических) тел – **координационные числа** и симметрия элементарной ячейки: во всех случаях важнейшим инструментом предсказания является **ПСЭ**.

Водородная связь

Первичная структура
(цепочка аминокислот)

Вторичная структура
(α -спираль)

Третичная структура

Четвертичная структура
(клубок белков)

Для водородной связи необходимо наличие двух полярных ковалентных связей, в образовании одной из которых участвует атом водорода, а другой - электроотрицательный атом (кислород, азот, галоген). Водородная связь считается ключевым взаимодействием в супрамолекулярной химии. Она определяет структуру белков, двойной спирали ДНК, воды и льда, супрамолекулярных ансамблей, полимеров, оказывает влияние на свойства многих растворов.

Энергия меняется в широких пределах - от 5 до 100 кДж/моль, однако обычно водородная связь намного слабее ковалентных связей. В зависимости от энергии, водородная связь имеет различный характер - от чисто электростатического (слабые связи) до преимущественно ковалентного (сильные связи).

Элементы-неметаллы

1	2		13	14	15	16	17	18
H							(H)	He
Li	Be		B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg		Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	d-block	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr		In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba		Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra							

Всего **25** элементов-
неметаллов, из них **3**
радиоактивны

1. Число валентных e^- :
 $n=N-10$
2. Электроотрицательность
увеличивается слева
направо и снизу вверх
3. Основные
положительные степени
окисления $n, n-2$
4. Основная отрицательная
степень окисления $-(8-n)$

- Молекулярные, слоистые или цепочечные структуры с малыми к.ч.
- Плохо проводят электрический ток
- Обладают малой эластичностью и большой хрупкостью
- Имеют высокие значения электроотрицательности, больше потенциалы ионизации
- Легко образуют анионы, реагируя с металлами
- Не выделяют водород из кислот
- Образуют ковалентные оксиды, обычно с кислотными свойствами
- Образуют молекулярные фториды
- Образуют молекулярные гидриды, обладающие восстановительными свойствами

Благородные газы

He гелий (солнечный)

Ne неон (новый)

Ar аргон (недеятельный)

Kr криптон (скрытый)

Xe ксенон (чужой)

Rn радон (радиоактивный)

1. Имеют завершённые электронные оболочки
2. Очень не реакционноспособны
3. He, Ne, Ar не образуют химических соединений
4. Известны производные ксенона в с.о. +2, +4, +6, +8

Элементы-металлы в ПС

Щелочные и щелочноземельные металлы

	1	2		13	14	15	16	17	18
	H							(H)	He
s-металлы	Li	Be	d-block	B	C	N	O	F	Ne
	Na	Mg		Al	Si	P	S	Cl	Ar
	K	Ca		Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
	Rb	Sr		In	Sn	Sb	Te	I	Xe
	Cs	Ba		Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
	Fr	Ra							

Щелочные металлы

Щелочноземельные металлы

p-Металлы

1	2		13	14	15	16	17	18
H							(H)	He
Li	Be		B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg		Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	d-block	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr		In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba		Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra							

p-металлы

Al

Pb

1. Электронные конфигурации, как у неметаллов – незавершенный *p*-подуровень
2. Легкоплавкие металлы
3. Малые значения I_1
4. Устойчивы положительные степени окисления $+n$ и $+(n-2)$
5. Вниз по подгруппе увеличивается стабильность с.о. $+(n-2)$
6. Химическая активность меньше, чем у *s*-металлов

d-Металлы

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ряд	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
2 ряд	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
3 ряд	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg

+ лантаниды

триада железа

платиновые металлы

монетные металлы

Изменение электронной конфигурации:

от $[\text{Ng}]ns^2(n-1)d^1$

до $[\text{Ng}]ns^2(n-1)d^{10}$

«Координационная связь» и «наномускул»

Жан – Мари Лен, супрамолекулярные соединения

f-металлы

4*f*-металлы – лантаниды

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Hf
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	Rf

Chapter 22 Opener

Shriver & Atkins Inorganic Chemistry, Fourth Edition

© 2006 by D. F. Shriver, P. W. Atkins, T. L. Overton, J. P. Rourke, M. T. Weller, and F. A. Armstrong

5*f*-металлы – актиниды

1. Заполняется *f*-подуровень $n-2$ периода
2. Лантаниды: степени окисления +3 для всех элементов, а также Ce^{+4} , Eu^{2+}
3. Лантаниды: радиус уменьшается от La до Lu (*лантанидное сжатие*)
4. Актиниды: химически очень разнообразны, с.о. от +2 до +7
5. Все актиниды, а также Pm радиоактивны
6. Для всех *f*-элементов характерны высокие координационные числа

Особенности элементов-металлов

1. Широкий диапазон твердости и пластичности
2. Широкий диапазон температур плавления

3. Различная реакционная способность
4. Различная электроотрицательность, но $\chi \leq 2$.
5. Различная удельная проводимость, но $d\sigma/dT < 0$

Нобелевская премия 2011 г.

Prof. Dan Shechtman
(Израиль)

1984, НИСТ США,
 $Al_{0,86}Mn_{0,14}$
ЭД с осью
симметрии 5-го
порядка

В квазикристаллах состава Al-Pd-Mn структура состоит из трех вставленных друг в друга оболочек, содержащих в общей сложности 51 атом.

Интерметаллиды – Квазикристаллы

Пространственное строение **молекул** – важнейшая область химии, поскольку очень часто химические свойства и реакционная способность, в частности, определяется не составом, а именно строением молекулы. Исходя из знания, какая по типу химическая связь реализуется в веществе, иногда сложно сказать о конфигурации «строительных блоков» (например, молекул), из которых состоит вещество.

В частном случае ковалентной связи существует ряд классических, упрощенных подходов, которые позволяют предсказать конфигурацию, в том числе, использование понятия **гибридизации** связей и **метода Гиллеспи**.

Направленность связи

Ковалентная связь образуется в направлении между атомами

Понятие о гибридизации

sp :	180°	BeH_2	гантель
sp^2 :	120°	BCl_3	треугольник
sp^3 :	$109^\circ 28'$	CH_4	тетраэдр

Гибридные орбитали (sp^3)

Вывод гибридных орбиталей:

$$h_1 = \phi(s) + \phi(p_x) + \phi(p_y) + \phi(p_z)$$

$$h_2 = \phi(s) - \phi(p_x) - \phi(p_y) + \phi(p_z)$$

$$h_3 = \phi(s) - \phi(p_x) + \phi(p_y) - \phi(p_z)$$

$$h_4 = \phi(s) + \phi(p_x) - \phi(p_y) - \phi(p_z)$$

«Нано»углерод (sp^2)

ТЕМ наблюдение **Т.Иijima** (**Nature, 1991**) коаксиальных многостенных нанотрубок с различными внутренними диаметрами и числом оболочек с различной хиральностью.

Л.В.Радужкевич, В.М.Лушкинович. О структуре углерода, образующегося при термическом разложении окиси углерода на железе ЖФХ (**1952**)

Гибридизация и локализация

Понятие о гибридизации вводят для объяснения геометрической и энергетической равноценности химических связей, которые представляются как локализованные между взаимодействующими атомами.

Но:

Только в двухатомных молекулах химическая связь полностью локализована !

Ограничения

Только у атомов элементов 2го периода остов состоит из 1s-оболочки. Как следствие, валентные 2s и 2p орбитали находятся в одной и той же области пространства –
– смешивание орбиталей реально!

«Выбор» молекулами геометрии

Любая молекула в основном состоянии имеет ту геометрическую форму, которая соответствует минимуму полной энергии и, соответственно, максимуму суммарной энергии всех химических связей

В основе метода Гиллеспи: минимизация ослабления химической связи при минимализации отталкивания электронных пар (связывающих и неподеленных)

Модель отталкивания электронных пар валентной оболочки

Роналд
Джеймс
Гиллеспи

Метод Гиллеспи: (теория Р.Гиллеспи – Р. Найхолма)
теория взаимного отталкивания электронных пар

Основа – метод ВВС

1. Направленность ковалентной связи
2. Связь $2s - 2e$

Structure 2-2
Shriver & Atkins Inorganic Chemistry, Fourth Edition
© 2006 by D. F. Shriver, P. W. Atkins, T. L. Overton, J. F. Rourke, M. T. Weller, and F. A. Armstrong

Structure 2-3
Shriver & Atkins Inorganic Chemistry, Fourth Edition
© 2006 by D. F. Shriver, P. W. Atkins, T. L. Overton, J. F. Rourke, M. T. Weller, and F. A. Armstrong

Задача:

Определить (предсказать) геометрическую конфигурацию молекул и ионов на основе установления числа электронных пар, окружающих центральный атом

Structure 2-20
Shriver & Atkins Inorganic Chemistry, Fourth Edition
© 2006 by D. F. Shriver, P. W. Atkins, T. L. Overton, J. F. Rourke, M. T. Weller, and F. A. Armstrong

Роль центрального атома

плоский

треугольник

тригональная

пирамида

T-образная
молекула

нитроил – катион

нитрит – анион

ДИОКСИД

азота

Приведенные примеры кажутся, на первый взгляд, противоречащими друг другу и необъяснимыми, однако введение дополнительных факторов, которые рассмотрены ниже, позволяют вполне логично описать указанные молекулярные конфигурации.

Положения метода Гиллеспи

Правило 1

Поделенные и неподеленные электронные пары располагаются вокруг центрального атома таким образом, чтобы быть максимально удаленными друг от друга

Правило 2

Неподеленная (несвязывающая) электронная пара занимает больший объем, чем поделенная (связывающая)

Пример

Тип: AB_4

Геометрия: тетраэдр

Расположение небольшого числа электронных пар на поверхности сферы

2 пары

3 пары

4 пары

Тригон.
бипирамида

5 пар

Октаэдр

6 пар

пентагон.
бипирамида

7 пар

$$СЧ = L + E$$

стерическое

число

подел.

э.п.

неподел.

э.п.

Тригональная бипирамида

экваториальное положение
неподеленных пар энергетически
предпочтительней

$\angle 90^\circ$ – аксиал. НП

$\angle 90^\circ$ – экватор. НП

Применения метода Гиллеспи

Молекула NH_3

Всего $8 e^-$

$[5 e^- (\text{N}) + 3 \times 1 e^- (\text{H})]$

$3 \text{ } 2s - 2e \text{ связи} + 1 \text{ н.п.}$

$\longleftarrow 4 e^- \text{-пары}$

Тип: AB_3E

A – центральный атом

B – лиганд ($2s - 2e$ связь)

E – неподеленная пара

Геометрия: тригональна прирамида (реальная)

Псевдотетраэдр (с учетом e^- -пары)

$\angle \text{H} - \text{N} - \text{H} = 107.3^\circ$

Общее число электронных пар.	Геометрия 0 свободных пар	1 свободная пара	2 свободные пары	3 свободные пары
2	Линейная			
3	Равносторонний треугольник	Искаженная		
4	Тетраэдр	Тригональная пирамида	Искаженная	
5	Тригональная бипирамида	Бисфеноид	Т-форма	Искажённая
6	Октаэдр	Квадратная пирамида	Плоский квадрат	
7	Пентагональная бипирамида	Пентагональная пирамида	Искажённая

$\angle\text{HCH} = 109,5^\circ$

$\angle\text{HNH} = 107,3^\circ$

$$\angle \text{HON} = 104,5^\circ$$

Изоэлектр. ряд молекул

С4 (q)	Число неподелен- ных пар	Структура молекул	Пример
2	n 0	линейная	$\text{BeH}_2, \text{CO}_2, \text{MgCl}_2$
3	0	плоская тригональная	<u>SO_3</u> , <u>BF_3</u>
3	1	изогнутая	<u>SO_2</u> , <u>O_3</u>

С4 (q)	Число неподелен- ных пар	Структура молекул	Пример
4	0	<p data-bbox="556 622 1161 686">тетраэдрическая</p>	$\text{CH}_4, \text{CF}_4,$ SO_4^{2-}
4	1	<p data-bbox="320 986 1373 1051">тригонально-пирамидальная</p>	$\text{NH}_3, \text{PF}_3,$ AsCl_3
4	2	<p data-bbox="1025 1350 1392 1415">изогнутая</p>	$\text{H}_2\text{O}, \text{H}_2\text{S}$ SF_2

СЧ

Число

Структура

Пример

q

неподелен-
ных пар n

молекул

5

0

PF_5, PCl_5, AsF_5

тригональная бипирамидальная

5

1

SF_4

искаженная тетраэдрическая

СЧ

Число

Структура

Пример

q

неподеленных пар n

молекул

5

2

ClF_3

T-образная

5

3

XeF_2, I_3^-, IF_2^-

линейная

СЧ	Число	$Al_{q-n}E_n$	Пример
q	неподеленных пар n	Структура молекул	
6	0	<p data-bbox="703 786 1271 851">октаэдрическая</p>	SF_6
6	1	<p data-bbox="510 1243 1495 1308">квадратная пирамидальная</p>	IF_5

СЧ	Число	$Al_{q-n}E_n$	Пример
q	неподеленных пар n	Структура молекул	
6	2		XeF_4, IF_4^-
		квадратная

Искаженный тетраэдр

Эффект неодинаковых атомов

«Неодинаковые атомы» с разной электроотрицательностью перераспределяют электронную плотность в молекуле, поэтому в модели Гиллеспи они изменяют объем электронной пары, которая образует ковалентную связь с такими «неодинаковыми атомами».

ЭТИЛЕН

формальдегид

Наименее ЭО группы в эквивалентной позиции (как НП) – занимают «большой» объем

Дополнения

Правило 3

Объем, занимаемый электронной парой, уменьшается с ростом электроотрицательности лиганда

Правило 4

Две электронные пары одной двойной связи занимают больший объем, чем одна пара простой связи

псевдотетраэдр

Ограничения метода Гиллеспи

1. Неприменимость к большинству соединений s и d-элементов

d-электроны !

?

гантель

ИОННОСТЬ СВЯЗИ !

?

2. Невозможность предсказания инертности электронной пары

инертная электронная пара !

Если говорить строго...

1. Геометрия молекул, определяемая из правила Гиллеспи, не имеет отношения к гибридизации орбиталей
2. Гибридизация с помощью математических операций помогает представить ковалентные связи направленными
3. Реальная гибридизация как механизм, а не как модель, может проявляться только у элементов 2-го периода

Хиральность

аланин

Зеркало

а - центр; б - ось; в - плоскость; г - винтовая пов-сть; д - топологич. связь; А, В, С, D - разл. атомы или группы атомов, М - атом металла, L - лиганд

Метод гибридизации орбиталей и метод Гиллеспи являются простыми в использовании и для многих молекул с «классическими» ковалентными связями позволяют полуэмпирически предсказать правильные конфигурации, однако цена за это то, что они не являются универсальными и имеют ряд серьезных ограничений, которыми нельзя пренебрегать.

В историческом (и учебном) плане это отличные модели, отталкиваясь от которых понимаешь в дальнейшем лучше более сложные подходы, позволяющие более адекватно и универсально описать конфигурацию молекул, в том числе и метод молекулярных орбиталей, который в настоящее время предпочтителен для расчета и предсказания строения молекул.